

FRONTLINE Combo[®]

Composition qualitative et quantitative :

FRONTLINE Combo Spot-On **Chat** Fipronil 50 mg. (S)-méthoprène 60.0 mg. Butylhydroxyanisole (E320) 0.10 mg. Butylhydroxytoluène (E321) 0.05 mg. Excipient QSP 1 pipette 0.5 ml.

FRONTLINE Combo Spot-On **Chien S** Fipronil 67 mg. (S)-méthoprène 60.3 mg. Butylhydroxyanisole (E320) 0.13 mg. Butylhydroxytoluène (E321) 0.07 mg. Excipient QSP 1 pipette de 0.67 ml.

FRONTLINE Combo Spot-On **Chien M** Fipronil 134 mg. (S)-méthoprène 120.6 mg. Butylhydroxyanisole (E320) 0.27 mg. Butylhydroxytoluène (E321) 0.13 mg. Excipient QSP 1 pipette de 1.34 ml.

FRONTLINE Combo Spot-On **Chien L** Fipronil 268 mg. (S)-méthoprène 241.2 mg. Butylhydroxyanisole (E320) 0.54 mg. Butylhydroxytoluène (E321) 0.27 mg. Excipient QSP 1 pipette de 2.68 ml.

FRONTLINE Combo Spot-On **Chien XL** Fipronil 402 mg. (S)-méthoprène 361.8 mg. Butylhydroxyanisole (E320) 0.80 mg. Butylhydroxytoluène (E321) 0.40 mg. Excipient QSP 1 pipette de 4.02 ml.

Forme pharmaceutique : Solution pour spot-on. Solution claire ambrée.

Indications d'utilisation, en spécifiant les espèces cibles :

A utiliser contre les infestations par les puces seules ou les infestations mixtes par les puces et les tiques et/ou les poux broyeurs.

Chez les chiens - Traitement de l'infestation par les puces (*Ctenocephalides spp.*). L'efficacité insecticide contre les nouvelles infestations par les puces adultes persiste pendant 8 semaines. Prévention de la multiplication des puces par inhibition du développement des œufs (activité ovicide) et des larves et pupes (activité larvicide) issues des œufs pondus par les puces adultes pendant 8 semaines après application. - Traitement de l'infestation par les tiques (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor variabilis*, *Dermacentor reticulatus*, *Rhipicephalus sanguineus*). Le produit a une efficacité acaricide contre les tiques qui persiste jusqu'à 4 semaines. - Traitement de l'infestation par les poux broyeurs (*Trichodectes canis*). Le médicament peut être intégré dans un programme de traitement de la *Dermatite par Allergie aux Piqûres de Puces* (DAPP).

Chez les chats - Elimination des puces (*Ctenocephalides spp.*). L'efficacité insecticide contre les nouvelles infestations par les puces adultes persiste pendant 4 semaines. Prévention de la multiplication des puces par inhibition du développement des œufs (activité ovicide) et des larves et pupes (activité larvicide) issues des œufs pondus par les puces adultes pendant 6 semaines après application. Elimination des tiques (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor variabilis*, *Rhipicephalus sanguineus*). Le produit a une efficacité acaricide contre les tiques qui persiste selon les données expérimentales jusqu'à 2 semaines. Elimination des poux broyeurs (*Felicola subrostratus*). Le médicament peut être intégré dans un programme de traitement de la *Dermatite par Allergie aux Piqûres de Puces* (DAPP).

Chez les furets - A utiliser contre les infestations par des puces seules ou des infestations mixtes par des puces et des tiques. - Elimination des puces (*Ctenocephalides spp.*). L'efficacité insecticide contre les nouvelles infestations par les puces adultes persiste pendant 4 semaines. Prévention de la multiplication des puces par inhibition du développement des œufs (activité ovicide) et des larves et pupes (activité larvicide) issues des œufs pondus par les puces adultes. - Elimination des tiques (*Ixodes ricinus*). Le produit a une efficacité acaricide contre les tiques qui persiste (selon les données expérimentales) pendant 4 semaines.

Posologie

Chats : la dose minimale recommandée est de 5 mg de fipronil et 6 mg de (S)-méthoprène par kg de poids corporel, en une application cutanée, soit une pipette de 0.5 ml pour un chat. En l'absence de données de tolérance, l'intervalle minimum de traitement est de 4 semaines.

Furets : Une pipette de 0.5 ml par furet, soit une dose de 50 mg de fipronil et 60 mg de (S)-méthoprène par furet, en une application cutanée. L'intervalle minimum de traitement est de 4 semaines.

Chiens : la dose minimale recommandée est de 6.7 mg de fipronil et de 6 mg de (S)-méthoprène par kg de poids corporel, en une application cutanée. *Chien de 2 à 10 kg* : une pipette de FRONTLINE Combo Spot-On Chien S par animal (0.67 ml), *Chiens de 10 à 20 kg* : une pipette de FRONTLINE Combo Spot-On Chien M par animal (1.34 ml), *Chiens de 20 à 40 kg* : une pipette de FRONTLINE Combo Spot-On Chien L par animal (2.68 ml), *Chiens de plus de 40 kg* : une pipette de FRONTLINE Combo Spot-On Chien XL par animal (4.02 ml). En l'absence de données de tolérance, l'intervalle minimum de traitement est de 4 semaines.

Contre-indications :

En l'absence de données disponibles, ne pas traiter les chatons de moins de 8 semaines ou pesant moins de 1 kg ; ne pas traiter les furets de moins de 6 mois ; ne pas traiter les chiots de moins de 8 semaines ou pesant moins de 2 kg. Ne pas utiliser chez les animaux malades (par exemple : maladies systémiques, fièvre) ou convalescents. Ne pas utiliser chez les lapins, car des effets secondaires parfois létaux peuvent avoir lieu. En l'absence d'étude, l'utilisation du produit n'est pas recommandée pour les espèces non cibles. FRONTLINE Combo Spot-On Chien : ce produit a été spécialement développé pour les chiens. Ne pas utiliser chez les chats ou les furets car cela peut conduire à un surdosage.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament aux animaux :

Ce produit peut provoquer une irritation des muqueuses, de la peau et des yeux. Donc éviter le contact du produit avec la bouche, la peau et les yeux. Les animaux ou les utilisateurs ayant une hypersensibilité connue aux insecticides ou à l'alcool devraient éviter le contact avec le médicament. Eviter le contact du contenu avec les doigts. Si cela se produit, se laver les mains avec de l'eau et du savon. En cas d'exposition accidentelle des yeux, rincer à l'eau pure avec soin. Se laver les mains après utilisation. Ne pas manipuler les animaux traités et ne pas autoriser les enfants à jouer avec les animaux traités jusqu'à ce que le site d'application soit sec. Il est donc recommandé que les animaux ne soient pas traités dans la journée mais plutôt en début de soirée, et que les animaux récemment traités ne soient pas autorisés à dormir avec les propriétaires, surtout les enfants. Ne pas fumer, boire ou manger pendant l'application.

Effets indésirables (fréquence et gravité) :

Ne pas surdoser.

Chats - Parmi les effets secondaires très rarement suspectés, des réactions cutanées transitoires au niveau du site d'application (desquamation, perte de poils, démangeaison, rougeur localisées) ainsi que des démangeaisons ou une perte de poils généralisées ont été rapportés. De la salivation excessive, des signes nerveux réversibles (augmentation de la sensibilité à la stimulation, abattement, autres signes nerveux) ou des

vomissements ont aussi été observés après utilisation. En cas de léchage, une brève période de salivation excessive due principalement à la nature de l'excipient peut être observée.

Chiens - Parmi les effets secondaires très rarement suspectés, des réactions cutanées transitoires au niveau du site d'application (décoloration de la peau, perte de poils, démangeaison, rougeur localisées) ainsi que des démangeaisons ou une perte de poils généralisées ont été rapportés. Une salivation excessive, des signes nerveux réversibles (augmentation de la sensibilité à la stimulation, abattement, autres signes nerveux) ou des vomissements ont aussi été observés après utilisation. En cas de léchage, une brève période de salivation excessive due principalement à la nature de l'excipient peut être observée.

Temps d'attente : Sans objet.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché : MERIAL - 29 avenue Tony Garnier - F-69007 LYON.

Présentations :

FRONTLINE Combo Spot-On **Chat** FR/V/3168431 0/2003. Plaquette thermoformée de 1 pipette à embout sécable de 0.5 ml. Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 0.5 ml. Boîte de 2 plaquettes thermoformées de 3 pipettes à embout sécable de 0.5 ml.

FRONTLINE Combo Spot-On **Chien S** FR/V/7543476 4/2003. Plaquette thermoformée de 1 pipette à embout sécable de 0.67 ml. Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 0.67 ml. Boîte de 2 plaquettes thermoformées de 3 pipettes à embout sécable de 0.67 ml.

FRONTLINE Combo Spot-On **Chien M** FR/V/7565368 8/2003. Plaquette thermoformée de 1 pipette à embout sécable de 1.34 ml. Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 1.34 ml. Boîte de 2 plaquettes thermoformées de 3 pipettes à embout sécable de 1.34 ml.

FRONTLINE Combo Spot-On **Chien L** FR/V/2879019 8/2003 Plaquette thermoformée de 1 pipette à embout sécable de 2.68 ml. Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 2.68 ml. Boîte de 2 plaquettes thermoformées de 3 pipettes à embout sécable de 2.68 ml.

FRONTLINE Combo Spot-On **Chien XL** FR/V/8787746 7/2003. Plaquette thermoformée de 1 pipette à embout sécable de 4.02 ml. Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 4.02 ml. Boîte de 2 plaquettes thermoformées de 3 pipettes à embout sécable de 4.02 ml. Date A.M.M. 23/01/03. *Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.*

Classement du médicament en matière de délivrance : Usage vétérinaire.